

# NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 16/02/2015

## Dénomination du médicament

**CICATRYL, pommade en sachet-dose**

## Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## Sommaire notice

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CICATRYL, pommade en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CICATRYL, pommade en sachet-dose ?
3. COMMENT PRENDRE CICATRYL, pommade en sachet-dose ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER CICATRYL, pommade en sachet-dose ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE CICATRYL, pommade en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

#### Classe pharmacothérapeutique

Protecteur cutané.  
(D: Dermatologie).

#### Indications thérapeutiques

La pommade CICATRYL est utilisée pour le traitement local des plaies et brûlures superficielles peu étendues.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CICATRYL, pommade en sachet-dose ?**

#### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

#### Contre-indications

##### **N'utilisez jamais CICATRYL pommade en sachet-dose:**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans CICATRYL, pommade en sachet-dose.

## Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

**Faites attention avec CICATRYL pommade en sachet-dose:**

### **Mises en garde spéciales**

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle (E 218) et du parahydroxybenzoate de propyle (E 216) et peut provoquer des réactions allergiques.

Ces réactions allergiques sont [décrites dans le paragraphe «Quels sont les effets indésirables éventuels »](#).

### **Précautions d'emploi**

Comme il est d'usage pour toute plaie, un nettoyage préalable est conseillé.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER AVIS A VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

## Interactions avec d'autres médicaments

### **Utilisation d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien

## Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

## Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

## Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

### **Grossesse et allaitement**

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## Sportifs

Sans objet.

## Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

## Liste des excipients à effet notoire

**Informations importantes concernant certains composants de CICATRYL, pommade en sachet-dose**

**Liste des excipients à effet notoire:** parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), parahydroxybenzoate de propyle (E 216).

## 3. COMMENT PRENDRE CICATRYL, pommade en sachet-dose ?

### Instructions pour un bon usage

Sans objet.

## Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

### **Posologie**

Se laver soigneusement les mains.

Appliquer une couche de Cicatryl sur la région de la peau concernée et la faire pénétrer par léger massage du bout des doigts.

En règle générale 1 ou 2 applications par jour sur la région de la peau concernée en fonction de la nature et l'importance de la blessure ou de la brûlure.

- Si le pourtour de la plaie est irritée, faire déborder largement l'application de CICATRYL au-delà de la blessure à traiter.
- Si la blessure ou la brûlure est trop douloureuse, la recouvrir avec une gaze préalablement enduite de CICATRYL.

### **Voie d'administration**

Voie cutanée.

### **Symptômes et instructions en cas de surdosage**

Sans objet.

### **Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses**

Sans objet.

### **Risque de syndrome de sevrage**

Sans objet.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

### **Description des effets indésirables**

Comme tous les médicaments, CICATRYL, pommade en sachet-dose est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables suivants peuvent survenir:

- un eczéma de contact,
- une réaction allergique: (démangeaisons, rougeurs cutanées et/ou brusque gonflement du visage et du cou). Si ces réactions surviennent, vous devez arrêter le traitement et consulter rapidement un médecin.

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Site internet : [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr).

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER CICATRYL, pommade en sachet-dose ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

### **Date de péremption**

Ne pas utiliser CICATRYL, pommade en sachet-dose après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

### **Conditions de conservation**

Pas de précautions particulières de conservation.

### **Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration**

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

## Liste complète des substances actives et des excipients

### Que contient CICATRYL, pommade en sachet-dose ?

#### Les substances actives sont:

Allantoïne .....	1,000
g	
Guaiazulène .....	0,007
g	
Para-chlorométacresol .....	0,120
g	
Acétate d'alpha-tocophérol .....	0,010
g	

Pour 100 g de pommade.

#### Les autres composants sont:

Parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), parahydroxybenzoate de propyle (E 216), paraffine liquide légère, vaseline officinale, mélange d'alcool cétostéarylique (90 pour cent) et de cétyle stéaryl sulfate sodique (10 pour cent), mélange d'alcool cétostéarylique (70 pour cent) de cétyle stéaryl sulfate sodique (10 pour cent) et d'acide gras éthoxylé d'origine organique (20 pour cent), monostéarate de glycérol, macrogol glycol 400, sorbitol (solution à 70 pour cent), eau purifiée.

## Forme pharmaceutique et contenu

### Qu'est-ce que CICATRYL, pommade en sachet-dose et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de pommade.

Boîte de 14, 16, 18 ou 20 sachets de 1 g.

Boîte de 1, 12, 14, 18, 24, 28 ou 140 sachets de 2 g.

Boîte de 6 sachets de 2 g + 10 sachets de 1 g.

Boîte de 8 sachets de 2 g + 8 sachets de 1 g.

Boîte de 3 sachets de 4 g + 14 sachets de 2 g.

Boîte de 2 sachets de 4 g + 10 sachets de 2 g.

## Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

### *Titulaire*

**PIERRE FABRE MEDICAMENT**  
45, PLACE ABEL GANCE  
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

### *Exploitant*

**PIERRE FABRE MEDICAMENT**  
45 place Abel Gance  
92100 BOULOGNE

### *Fabricant*

**NEXTPHARMA S.A.S**  
17, ROUTE DE MEULAN  
78520 LIMAY  
ou

**PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION**  
SITE PROGIPHARM  
RUE DU LYCEE  
45500 GIEN

## Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

**Date d'approbation de la notice**

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

**AMM sous circonstances exceptionnelles**

Sans objet.

**Informations Internet**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

**Informations réservées aux professionnels de santé**

Sans objet.

**Autres**

Sans objet.